

## Guide til fortolkning af deltagerrapport


31. januar 2018

Deltagerrapporten giver bl.a. mulighed for at se, hvordan deltagerne er fordelt på fx alder, hvor mange år deltageren har røget, dagligt forbrug af tobak, hvem der har opfordret til rygeophør mm. Rygestopbasens deltagerrapport er sammentællinger af svar fra basisskemaer og opfølgningsskemaer.

En deltagerrapport trækkes i Rygestopbasens tastselv-miljø under fanen 'Rapporter', hvor det er muligt at vælge en specifik tidsperiode, alder, køn, erhvervsmæssig status og andre datafiltre. Kun brugerprofiler, der er enhedsansvarlige, har mulighed for at trække rapporter.

Nedenfor ses et eksempel på en deltagerrapport med en specifik tidsperiode: 01-01-2016 – 31-12-2016 og deltagere i aldre mellem 30-60 år.

I det følgende vil deltagerrapporten blive gennemgået med udgangspunkt i dette eksempel.



The screenshot shows the 'Rygestopbasen' web application. At the top right, there is a user profile 'Hej, student!' with a 'Log af' button. A navigation menu includes 'Administration', 'Kurser', 'Opfølgning', 'Rapporter', and 'Hjælp'. The 'Rapporter' menu is open, showing options for 'Kursusrapport', 'Deltagerrapport', 'Indikatorrapport', and 'Rådata'. The 'Deltagerrapport' option is selected.

**Deltagerrapport**

Udskriv

| Rapportinformation |  |
|--------------------|--|
| Bruger             | Rygestopbasens Studentermedhjælper   |
| Dato               | 25-okt-2017 14:08  |
| Datagrundlag       | Hovedenhed: <input type="text"/>   |
| Filtre             | Kursusstartdato mellem 01-01-2016 og 31-12-2016; Deltagere Alder mellem 30 og 60 |

|                        | I alt |      |
|------------------------|-------|------|
|                        | I alt | %    |
| Indsendte basisskemaer | 101   | 100  |
| Har gennemført kursus  | 68    | 67,3 |

DK: Tabel 1

|                   | I alt      |             |             |
|-------------------|------------|-------------|-------------|
|                   | Gennemsnit | 25% Fraktil | 75% Fraktil |
| Alder             | 47,9       | 43          | 53          |
| År røget          | 30,3       | 24          | 40          |
| Fagerstrøms score | 6,0        | 5           | 7           |
| Antal pakkeår     | 28,9       | 16          | 40          |

DK: Tabel 2

## Guide til fortolkning af deltagerrapport

|                        | I alt |      | Forklaring  |
|------------------------|-------|------|---|
|                        | I alt | %    |   |
| Indsendte basisskemaer | 101   | 100  | Det samlede antal indsendte basisskemaer for enheden inden for de valgte datafiltre.  |
| Har gennemført kursus  | 68    | 67,3 | En deltager har gennemført et kursus ved deltagelse af minimum 75 % af de planlagte mødegange. På et 'Kom & Kvit' forløb skal en deltager være fremmødt mindst 4 gange, for at deltagelsen registreres som gennemført. Procentandelen af deltagere, der har gennemført et kursus kaldes også indikator 1, jvf. Rygestopbasens 5 kvalitetsmål. |

DK: Tabel 1

|                   | I alt      |             |             | Forklaring   |
|-------------------|------------|-------------|-------------|--|
|                   | Gennemsnit | 25% Fraktil | 75% Fraktil |  |
| Alder             | 47,9       | 43          | 53          | Gennemsnit, 25- og 75 % fraktiler er udregnet for alder, antal år røget, fagerstrøms score og antal pakkeår.   |
| År røget          | 30,3       | 24          | 40          | 25 % fraktilen er det tal, som 25 % af observationerne er mindre end. 75 % fraktilen er det tal, som 75 % af observationerne er mindre end. Fx er 75 % kvartilen for antal år røget på 40 år – dvs. 75 % af deltagerne har røget mindre end 40 år og 25 % har røget mere end 40 år.                            |
| Fagerstrøms score | 6,0        | 5           | 7           | 25 % fraktilen for alder er 43 år – dvs. 25 % af deltagerne er yngre end 43 år og 75 % er ældre end 43 år.   |
| Antal pakkeår     | 28,9       | 16          | 40          | Fagerstrøms score er et udtryk for nikotinafhængighed på en skala fra 0-10, hvor 0 er lavest og 10 er højest. Scoren er baseret på spørgsmål 5a-f på basisskemaet.<br><br>1 pakkeår svarer til 1 år med et dagligt forbrug af 20 gram tobak. 1 pakkeår beregnes således: (dagligt forbrug x antal år røget)/20 |

DK: Tabel 2

| Dagligt forbrug | I alt |      | Forklaring  |
|-----------------|-------|------|---|
|                 | I alt | %    |   |
| Under 15 gram   | 25    | 24,8 | Antal deltagere fordelt på dagligt forbrug af tobak, baseret på spørgsmål 5d på basisskemaet.<br><br>For samtlige tabeller er procentandelen udregnet ud fra det samlede antal indsendte basisskemaer (se tabel 1). Fx 'Under 15 gram': $25/101=24,8\%$ |
| 15-19 gram      | 18    | 17,8 |   |
| Over 19 gram    | 58    | 57,4 |   |

DK: Tabel 3

| Bor sammen med                         | I alt |     |        |      | Forklaring   |
|--|-------|-----|--------|------|--|
|  | Ja    | Nej | Ukendt | % Ja |  |
| Bor du sammen med en ryger?            | 34    | 67  | 0      | 33,7 | Antal deltagere fordelt på om de bor sammen med en ryger, voksne (over 18 år) og børn (under 18 år), baseret på spørgsmål 2-4 på basisskemaet.<br><br>Hver række svarer sammenlagt til det samlede antal indsendte basisskemaer (n=101). Ukendt betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret.<br><br>Procentandelen af 'Ja' er udregnet ud fra det samlede antal basisskemaer. Fx 'Bor du sammen med en ryger?': $34/101 = 33,7\%$ |
| Bor du sammen med voksne (over 18 år)? | 51    | 49  | 1      | 50,5 |  |
| Bor du sammen med børn (under 18 år)?  | 29    | 71  | 1      | 28,7 |  |

DK: Tabel 4

## Guide til fortolkning af deltagerrapport

| Tidligere forsøg på at stoppe | I alt |      | Forklaring   |
|-------------------------------|-------|------|--|
|                               | I alt | %    |  |
|                               |       |      | Antal deltagere fordelt på om de tidligere har forsøgt at stoppe med at ryge, baseret på spørgsmål 6 på basisskemaet.                        |
| Nej                           | 45    | 44,6 | Ukendt betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret. Procentandelen er udregnet ud fra det samlede antal basisskemaer. Fx 'Nej': 45/101 = 44,6 % |
| Ja                            | 53    | 52,5 |  |
| Ukendt                        | 3     | 3,0  |  |

DK: Tabel 5

| Opfordret til rygeophør   | I alt |      | Forklaring  |
|---------------------------|-------|------|---|
|                           | I alt | %    |   |
|                           |       |      | Antal besvarelser på hvem der har opfordret til et rygeophør inden for det seneste år, baseret på spørgsmål 7 på basisskemaet.              |
| Praktiserende læge        | 52    | 51,5 | For dette spørgsmål er det muligt at markere flere svar. Det betyder, at den samlede procentsats for denne tabel ofte vil blive over 100 %. |
| Læge på sygehus           | 25    | 24,8 |   |
| Plejepersonale på sygehus | 4     | 4,0  | Procentandelene er udregnet ud fra det samlede antal basisskemaer. Fx 'Læge på sygehus': 25/101 = 24,8 %                                    |
| Jordemoder                | 1     | 1,0  |   |
| Tandlæge                  | 22    | 21,8 |   |
| Andet sundhedspersonale   | 10    | 9,9  |   |
| Apotekspersonale          | 3     | 3,0  |   |
| Kommune/Stoplinien        | 8     | 7,9  |   |
| Ingen af overstående      | 31    | 30,7 |   |

DK: Tabel 6

| Røgfri ved kursets afslutning | I alt |      | Forklaring   |
|-------------------------------|-------|------|--|
|                               | I alt | %    |  |
|                               |       |      | Antal deltagere fordelt på røgfrihed ved kursets afslutning, baseret på spørgsmål 2 på opfølgningsskemaet. |
| Ja                            | 59    | 58,4 | Procentandelene er udregnet ud fra det samlede antal basisskemaer. Fx 'Nej': 30/101 = 29,7 %               |
| Nej                           | 30    | 29,7 |  |
| Ved ikke                      | 12    | 11,9 |  |

DK: Tabel 7

| Efterfølgende kontakt | I alt |     | Forklaring  |
|-----------------------|-------|-----|---|
|                       | I alt | %   |   |
|                       |       |     | Antal deltagere fordelt på om de ønsker efterfølgende kontakt, dvs. opfølgning efter 6 måneder. Spørgsmål 11 på basisskemaet.   |
| Ja                    | 101   | 100 | I dette eksempel har alle deltagere afkrydset 'ja' til, at en rådgiver eller ekstern konsulent må kontakte dem senere for at høre, hvordan det går. Procentandelen er udregnet ud fra det samlede antal basisskemaer: 101/101 = 100 % |
| Nej                   | 0     | 0   |   |

DK: Tabel 8

## Guide til fortolkning af deltagerrapport

| Følg op  | I alt |     |        |      | Forklaring  |
|--|-------|-----|--------|------|---|
|  | Ja    | Nej | Ukendt | % Ja |   |
| Har du været røgfri lige siden ovennævnte tilbud hos os? | 27    | 27  | 0      | 50   | Antal opfølgninger fordelt på røgfrihed efter 6 måneder, baseret på spørgsmål 2, 6 og 7 på opfølgningsskemaet.<br><br>Disse data er fra antallet af valide opfølgninger (se tabel 10). Derfor udregnes procentandelene ud fra antallet af valide opfølgninger. Fx 'Har du været røgfri de seneste 14 dage?' - Ja' 29/54=53,7%.<br><br>'Reduceret' angiver, andelen af deltagere, der har reduceret deres daglige tobaksforbrug ved opfølgningen i forhold til forbruget ved rygestopkursets start. 'Reduceret' er baseret på spørgsmål 5d på basisskemaet og spørgsmål 7 på opfølgningsskemaet.<br><br>Ukendt betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret. |
| Har du været røgfri de seneste 14 dage?                  | 29    | 25  | 0      | 53,7 |   |
| Reduceret  | 8     | 14  | 3      | 14,8 |   |

DK: Tabel 9

| Opfølgingsrate                 | I alt    |      | Forklaring  |
|--------------------------------|----------|------|---|
|                                | I alt Ja | % Ja |   |
| Opfølgingsrate efter 6 måneder | 90       | 89,1 | Opfølgingsrate efter 6 måneder angiver andelen af deltagere, hvor rådgiveren (eller en anden) har fulgt op eller forsøgt at følge op efter 6 måneder.<br><br>Valide opfølgninger angiver, at opfølgningen er foretaget inden for standardsintervallet, dvs. 6 mdr. +/- 1 måned efter rygestopdatoen (eller efter kursuslslutdatoen hvis der ikke har været planlagt en rygestopdato).<br><br>Årsag til manglende opfølgning angiver om skemaet "Årsag til manglende opfølgning" er udfyldt. Opfølgningen er hermed opgivet med en gyldig grund.<br><br>Procentandelene er udregnet ud fra det samlede antal deltagere, der har sagt ja til at blive fulgt op på efter 6 måneder (se tabel 8).<br>Fx 'Årsag til manglende opfølgning': 36/101 = 35,6 % |
| Valide opfølgninger            | 54       | 53,5 |   |
| Årsag til manglende opfølgning | 36       | 35,6 |   |

DK: Tabel 10

| På en skala fra 1-5  | I alt      | Forklaring   |
|--|------------|--|
| ... hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:                                    | Gennemsnit | Gennemsnit på tilfredshed med kurset fordelt på 4 spørgsmål. Spørgsmål 3a-d på opfølgningsskemaet.<br><br>Tilfredsheden er bedømt på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst. |
| Hvor tilfreds var du med rygestoprådgiverens indsats?                    | 4,5        |  |
| Hvor tilfreds var du med gruppens måde at fungere på?                    | 4,1        |  |
| Hvor tilfreds var du med tidspunktet på dagen, hvor kurset blev afholdt? | 4,4        |  |
| Hvor tilfreds var du med rygestopkurset som helhed?                      | 4,3        |  |

DK: Tabel 11

## Guide til fortolkning af deltagerrapport

| Anvendelse af produkter til rygestop | I alt     |      |                  |      | Forklaring  |
|--------------------------------------|-----------|------|------------------|------|---|
|                                      | Har brugt |      | Anvender aktuelt |      |   |
|                                      | I alt     | %    | I alt            | %    |   |
| Nikotinerstatning                    | 35        | 64,8 | 8                | 14,8 | Antal opfølgninger fordelt på anvendelse af rygetrangsreducerende medicin eller andre produkter efter rygestop. Spørgsmål 4 (har brugt) og 5 (anvender aktuelt) på opfølgningsskemaet.<br><br>For disse spørgsmål er det muligt at markere flere svar.<br><br>Procentandelene udregnes ud fra antal valide opfølgninger (se tabel 10). Fx 'Nikotinerstatning': $35/54 = 64,8\%$ |
| Vareniclin                           | 1         | 1,9  | 0                | 0    |   |
| Bupropion                            | 0         | 0    | 0                | 0    |   |
| Snus eller skrå                      | 0         | 0    | 0                | 0    |   |
| Andet                                | 2         | 3,7  | 1                | 1,9  |   |
| Ingen                                | 14        | 25,9 | 42               | 77,8 |   |
|                                      |           |      |                  |      |   |

DK: Tabel 12

| Er du interesseret i et nyt rygestoptilbud? | I alt |     |        |      | Forklaring  |
|---|-------|-----|--------|------|---|
|   | Ja    | Nej | Ukendt | % Ja |   |
| Er du interesseret i et nyt rygestoptilbud? | 21    | 4   | 0      | 84   | Antal valide opfølgninger fordelt på interesse i et nyt rygestoptilbud eller ej. Spørgsmål 8 på opfølgningsskemaet. Disse tal er baseret på andelen, der har svaret 'Nej' til 'Har du været røgfri i de seneste 14 dage?' (se tabel 9).<br><br>Procentandelen beregnes derfor som: $21/25 = 84\%$ |

DK: Tabel 13

Bemærk, at spørgsmål 13 og 14 på registreringskemaet gældende før den 01.07.2017 bevares på basisskemaet for hver enkelt deltager pr. 01.07.2017. Disse spørgsmål omhandler udlevering af gratis rygetrangsreducerende medicin samt kursusafgift.

Vi arbejder på at opdatere deltagerrapporten, så oplysningerne fremefter kan findes her.